

## هرمونات الذكورة مرتفعة لدى السيدات المصابات بشرة الطعام



كشفت دراسة سويدية حديثة أن الاضطرابات الهرمونية يمكن أن تكون سبباً رئيسياً تم إغفالها في الإصابة بالشرة. وقالت الباحثة السويدية سابين نايسين "اكتشفنا أن نحو ثلث السيدات المصابات بالشرة المرضى لديهن اضطرابات هرمونية يمكن أن تفسر اضطرابات تناول الطعام، وفي بعض الحالات يمكن أن تشير هذه الاضطرابات إلى التكوين الهرموني للمرأة أكثر من المرض النفسي. ويعتمد علاج هذا المرض على تقنية العلاج السلوكي المعرفي إلى جانب مضادات الاكتئاب حيث أنه ينجم غالباً عن عوامل نفسية. كما أشارت في بحثها إلى أن الشرة المرضي مرض مركب يتضمن عوامل جينية وهرمونية إلى جانب عوامل نفسية، ودرست نايسين 77 امرأة مصابة بالشرة المرضي و59 امرأة سليمة. ووجدت أن المصابات بالشرة المرضي كان لديهن مستويات أعلى من هرمون الذكورة التستوستيرون ومستويات

منخفضة من هرمون الأنوثة "الاستروجين" بينما المجموعة الأخرى كانت سليمة. إي بالمستوى الطبيعي، حيث يتعلق "التستوستيرون" بكيفية تنظيم الجسم للشهية والمستوى المرتفع منه يمكن أن يزيد الإحساس بالجوع. وبالنسبة لتقنية علاج مرضي الشرة بعلق منع الحمل، فهو يظل على تكوينه مادة الاستروجين فإنه يمكن تخفيض مستويات التستوستيرون "الشاملة".

## الحيوانات الأليفة تساعد أطفال التوحد على التفاعل مع الآخرين!!



يمكنك الاستعانة بكرة تنس صغيرة إذا كنت حقاً لا تستطيع السيطرة على طريقة نومك.

### الطريقة الرابعة:

استعمل أشربة التنفس، كتلك التي يستعملها الرياضيون للبقاء على مجاري التنفس مفتوحة، ومنع إغلاقتها. إذا كنت حقاً مصاباً بالإحباط من الشخير، يمكنك استعمال هذه الأشرطة، فهي سهلة الاستعمال ومضمونة النتائج.

### الطريقة الخامسة:

وأخيراً، تعتبر أفضل طريقة للتخلص من الشخير والحصول على الأكسجين أثناء النوم، أداء تمارين التنفس، تمرين العضلات وتقويتها عن طريق الاستنشاق والزفير المنظم. تأكد من حصولك على كمية وافرة من الأكسجين قبل النوم، وبإمكانك أن تترك غرفة نومك مفتوحة، وتكون قد قمت بتطهير أذنك وحلقك تماماً من في الأخير. أي سائل مخاطي عالق بها، وفي الأخير تنمى أن تكون قد وفقتنا بمساعدتك ومتمنى لك نوم هانئا ابتداء من هذه الليلة.



إشراف: د. أميمة عثمان

## تخلصي من الشخير أو من شريك حياتك!!

في غرفة النوم بالشخير الثقيل. كذلك تعمل الكحول بنفس الطريقة.



### الطريقة الأولى:

انظر إلى طعامك، بالرغم من أن هذا قد لا يكون الجواب الأمثل لحل مشكلة هذه الميزة ليست من الميزات الجذابة أبداً وتنتهي بعض تلك الزوجات بالفشل أو الطلاق وبنون أن يبذل الطرفین جهدهم لمعرفة العلاج أو الحل لتلك المشكلة. لذا سوف نساعدكم لمعرفة سبب الشخير ونسيطر عليه للقضاء على الشخير جذرياً، والوقاية منه لاحقاً أيضاً، وذلك بإتباع إحدى طرق العلاج التالية:

### الطريقة الثانية:

الوزن الزائد، والبدانة سبب آخر وعامل للإصابة بالشخير. يعمل الوزن الزائد على الضغط على الرقبة تكون المخاط الذي يقوم بدوره بإغلاق قناة التنفس وبالتالي الإصابة بنوبات من الاختناق والصغير الذي يترجم

## أنت تسأل .. ونحن نجيب

□ ما رأيكم في تناول البروتينات والامينو اسيد والكرياتين بحكم أي أمارس كمال الأجسام؟

– من المهم جدا لم يمارس رياضة كمال الأجسام أن يحصلوا على تغذية جيدة، فالتدريب بدون تغذية جيدة كمن يجذف عكس التيار، ويفضل أكل وجبات صغيرة متقاربة. وبالنسبة للأطعمة أو المواد التي تحتوي على بروتينات عالية فأنت تحتاجين إنا لم تكن تحصل على البروتينات من الأطعمة، فالجسم الذي يتدرب رياضة كمال الأجسام يتطلب يوميا 2 غ من البروتينات لكل كيلو غرام.

وتستطيع حساب الكمية التي يجب أن تأخذها من هذه المركبات التي تحتوي على البروتينات وحساب وزنك، وحساب كمية البروتينات التي تتناولها من الأطعمة ثم ما تبقى تأخذه من هذه المركبات. أما إن كانت كمية البروتينات كافية فيمكن أن تستغني عن الإضافات، أما عن آثارها الجانبية فليس لها آثار تذكر عند الأشخاص الأصحاء، وكما قلت لك أن الجرعة تعتمد على مدى ما تأخذه من البروتينات من الطعام، وحساب احتياجك من البروتينات بالنسبة لوزنك.

□ أعاني من زيادة في ملححة فمي، وما أري ما السبب!؟

– إن ما تعاني منه يدل على ارتفاع نسبة الأملاح المعدنية في اللعاب، وأنصحك أولا بفحص نسبة الأملاح في الدم، ومن ثم تغيير نوعية معجون الأسنان، فمن الممكن أن يكون المعجون هو السبب في تغير نسبة الوسط الحمضي في الفم.

وأیضا من الممكن أن تكون الحشوات الرصاص هي السبب في هذه الملوحة: لأنه يحصل بينها عدم توافق كهربائي. عليك زيارة طبيب الأسنان لفحص الأمر عن قرب، ومعرفة السبب الحقيقي للمشكلة.

□ ابنتي فقدت سمعها فجأة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتم عمل عملية الجيوب ووضع أنابيب في الغشاء الطبلي لتنظيف الماء الموجود في أذنها ولم تتحسن أبداً، فأرشدوني!؟

– قد يسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وخاصة في الأطفال إلى تأثيرات سلبية على العصب السمعي مؤدياً إلى تدهور واضح في قوة السمع، مما يسمى بالصمم العصبي.

أما ما تم إجراؤه من شق طبلة الأذن جراحياً ووضع أنبوبة تهوية لتصريف السائل المرتشح والمتجمع خلف الطبلة، فإنه يستخدم في علاج الصمم التوصيلي.

أما عن صراخ طفلك وبكائها في نومها في فترة فقدانها للسمع، فإنه ليس له أي علاقة بالعصب السمعي، وإنما سببه ارتفاع درجة الحرارة، والسبب المصاحب له سواء كان نتيجة التهاب حاد بالوزن أو التهاب طبلة الأذن مسبباً آلاماً حادة، مسببة هذا البكاء والصراخ.

□ منذ فترة وأنا لاحظ أن عيني اليسرى تدمع بدون أية مقدمات، ثم تهدأ لفترة ثم تعود ثانية، فما هو سبب ذلك؟ وما هو العلاج؟ علماً بأنني لا أنتاول أية أدوية!؟

– إن كثرة التدمع للعين يعود إلى أسباب عديدة من أهمها انسداد القناة الدمعية والتي تربط العين بالأنف أو وجود جفاف في العين بسبب التحسس أو التعرض لمواد مهيجة للعين ولا بد من تقييم ذلك عند الطبيب لمعرفة السبب، والعلاج يكون بحسب السبب.

## أدوية السعال ونزلات البرد خطيرة على الأطفال الصغار

### □ واشنطن / وكالات :

أفاد تقرير طبي جديد أن إعطاء أدوية السعال (الكحة) ونزلات البرد للأطفال الصغار تحت سن الثانية، يمكن أن يكون خطراً بل مميتاً أحياناً. أجرى الدراسة فريق بحث من مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، ونشرت في عدد الأسبوع الماضي من تقرير المراضة والوفيات الذي يصدره المركز، وعرضته ويب أم دي.

وفقاً للتقرير كان ثلاثة أطفال –أعمارهم ستة أشهر أو أقل– قد توفوا بالولايات المتحدة عام 2005 بعد تلقيهم أدوية كحة ونزلات برد. وقد وجد لدى الأطفال الثلاثة ما بدا أنه مستويات عالية من الأدوية المنزلة لاحتقان (decongestant) في مجرى الدم.

كذلك، تم نقل 1519 طفلاً في سن الثانية أو أقل إلى أقسام الطوارئ بين عامي 2004 و2005 لعلاجهم من الآثار الجانبية المتصلة بأدوية الكحة والبرد، بما في ذلك زيادة الجرعات.

ويشدد أحد مؤلفي التقرير الدكتور آدم كوهن أخصائي الأطفال بقسم التحريات الوبائية التابع لمركز السيطرة على الأمراض، على ضرورة أن يستشير الأهل اختصاصي رعاية طبية قبل إعطاء الطفل أدوية الكحة والبرد. وكان الباحثون قد بدؤوا دراستهم بعد تلقي المركز تقارير حول وفيات حديثة بين الأطفال الصغار قد تكون مرتبطة بجرعات زائدة من أدوية الكحة والبرد. وقام الباحثون باستبيان مسحي بين الأطباء المسؤولين عن رصد وتسجيل الوفيات في طول البلاد وعرضها، سائلين إياهم عن أي وفيات متصلة بأدوية الكحة والبرد. فاستجاب 15 طبيباً من 12 ولاية أمريكية وكندا.

ثم استخدم الباحثون بيانات قاعدة معلومات مخصصة لنظام مراقبة الإصابات إلكترونياً ومشروع الرقابة على التأثيرات الضارة للأدوية، والتي يديرها مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الدواء والغذاء وهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، لتقدير عدد زيارات أقسام الطوارئ المتصلة باستخدام الأطفال دون الثانية لأدوية الكحة والبرد.

تراوحت أعمار الأطفال المقيّنين نتيجة أدوية الكحة والبرد بين شهر وستة أشهر. كما وجدوا لديهم جميعاً مستويات عالية من مزيل احتقان الأنف "بسودوفيرين (pseudoephedrine) في عينات من دمائهم. وبلغت مستويات مزيل الاحتقان عندهم من 9 إلى 14 ضعفاً للمستوى الموجود طبيعياً لدى أطفال فوق سن الثانية لدى تلقيهم جرعات عادية. يلاحظ، د. كوهن تناغم نسبية مركز السيطرة على الأمراض للأهل باستشارة اختصاصي طبي مع التعليمات الواردة على غلاف عبوة الدواء، حيث تقول الأخيرة بضرورة استشارة الطبيب بالنسبة لاستخدام الدواء للأطفال دون الثانية.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء لم تصدر أي توجيهات محددة بالنسبة للجرعات المفررة من هذه الأدوية للأطفال دون سن الثانية. وبالنسبة للأهل الذين يقررون استخدام أدوية الكحة والبرد للأطفال فوق سن الثانية، يؤكد د. كوهن ضرورة أن يلتزموا بالجرعة الموصى بها على غلاف عبوة الدواء، وفي كل الأحوال تبقى استشارة طبيب أطفالهم فكرة جيدة.

### أخي المواطن أختي المواطنة :

## ممركتنا مع الإيدز معركة إلتزام جماعي

### الكل يشارك والكل فيها مسؤول

## ضرب الأطفال يحزنهم في مرحلة البلوغ



□ أوضحت دراسة أميركية حديثة بأن الأطفال الذين يتعرضون لإيذاء بدني أو إهمال تزيد لديهم احتمالات التعرض لاكتئاب شديد في مرحلة البلوغ. وقالت الدراسة "أن الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء بدني تزيد لديهم مخاطر الإصابة باكتئاب خطير على مدى حياتهم بنسبة 59٪ مقارنة مع نظرائهم من الأطفال الذين لم يتعرضوا لهذه الإساءة.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين إساءة المعاملة في الطفولة وبين الاكتئاب الحاد لكن الباحثين قالوا أن هذه الدراسة هي الأولى التي توضح أن الاكتئاب هو نتيجة للمعاملة السيئة.

وقالت رئيسة فريق الباحثين كاتي سبانتز ويديم هذه النتائج تركز على الحاجة لتحديد ومعالجة الآثار النفسية على المدى الطويل الناجمة عن إهمال الأطفال .

وقارن الباحثون بين حوالي 680 طفلاً تعرضوا لمعاملة سيئة وإهمال

قبل سن الحادية عشرة وبين 520 طفلاً من نفس المرحلة العمرية والعرق والجنس والوضع الاجتماعي. وجرت متابعة كل من المجموعتين إلى أن مرحلة البلوغ وحتى متوسط عمر 29 عاماً.

ووجدت الدراسة ان الأطفال الذين



من ذلك التقليدي بنسبة 40٪، ولكن تعيق ثقافتها ومعتقداتها السائدة العلماء يسعون إلى تحسينه لمكافحة انتشار وباء الإيدز في الدول التي الجنسي العادي.

## الذهاب إلى صير الذهب



□ أنزل في بريطانيا أحدث الطرق للكشف عن مرض الإيدز وذلك عن طريق فحص اللعاب. ويدعى هذا الفحص والذي يعتبر الأول من نوعه (DrThom) وتصل كلفته 25 جنيه إسترليني ويستطيع اكتشاف وجود الأجسام المضادة للفيروس الذي يسبب الإيدز. ويتم كل ذلك بدون الحاجة لأخذ عينة الدم. والفحص بسيط للغاية. إذ يكفي إرسال عينة من اللعاب إلى المختبر. وأن كانت النتيجة سلبية (الشخص غير مصاب بفيروس الإيدز) يجري إعلامه بها من طريق البريد الإلكتروني. أما إذا كانت إيجابية (الشخص مصاب بهذا الفيروس) عندهم يتلقى اتصالاً هاتفياً من قبل مستشار تتحور مهمته حول توصية المريض إجراء تحقيقات طبية إضافية.


وتسوق الشركة (Expert Health Limited) التي تنجز هذا الفحص (DrThom) الخدمة الجديدة لأجل تجنب هولاء الذين يخشون نيا اكتشاف إصابتهم بالأيديز وتدابيرته الكارثية ، على

## العلاقة بين الزهايمر وهرمون "التستوسترون" !!



المعتد على هرمون "التستوسترون" عمل على تحسين التستوستين بين العضلات لدى الفئران التي تعاني من مرض معروف باسم مرض التصلب الضموري أو (Lou Gehrig) الذي يصيب البشر كذلك.

## علماء صينيون يكافحون الملاريا في أفريقيا



□ كين / وكالات : يستعد علماء صينيون لتطبيق برنامج صحي لعلاج سكان جزيرة أفريقية من مرض الملاريا بعد نجاح هذا البرنامج في كمبوديا. وقال لي جوكيانغ الأستاذ بمعهد الأمراض الاستوائية في جامعة جيم انتشو للطب التقليدي جنوب الصين إن المشروع يهدف للقضاء على حامل الطفيل بين البشر، لأن المصدر الحقيقي للمرض هو البشر، وأكد أنه حينما يتم القضاء عليه بين البشر فإن التعرض لن يحمله. إذ إن التعرض ينقله من البشر. ويتضمن البرنامج إعطاء جرعة واحدة من عقار المعالجة المركبة بالأرتيميسين وعقار بريماكين للقضاء على الطفيل في أجسامهم، وتوصي منظمة الصحة العالمية بمجموعة عقاقير المعالجة المركبة بالأرتيميسين لعلاج الملاريا، وتستخرج مادة الأرتيميسين من عشب يزرع في الصين. ويتوقع العلماء أن تنخفض نسبة حاملي المرض من سكان الجزيرة بصورة

وفي حين يبلغ متوسط نسبة الإصابة بالملاريا في أكثر 10 قرى متضررة في موهيلي 50٪، فإن نسبة الإصابة تبلغ 94.4٪ في بعض القرى و605٪ في مناطق أخرى، والملاريا هي أكثر الأمراض المميتة إلى وفاة الأطفال دون سن الخامسة. وطبق في فريقه خطة مشابهة في كمبوديا في الأعوام الماضية وجاءت النتائج مرضية حيث انخفضت نسبة الإصابة بالملاريا بنسبة 90٪ في إحدى المناطق، وفي منطقة أخرى بلغت نسبة المصابين من 2 إلى 3% في اليوم 40من تعاطي الجرعة، وقبيل ذلك كان 57٪ من القرويين يحملون الطفيل. وبينما يعتقد بعض الخبراء أن القضاء على الملاريا تماماً أمر شبه مستحيل، يصير لي على أن القضاء عليها يتطلب حولا غير تقليدية، وقال إن الطريقة التقليدية هي قتل البعوض ولكننا ظلنا نعمل منذ 50 عاماً ولم نفلح .

كبرى مع بداية برنامج العلاج، وسيتم إعطاء جرعة ثانية من العقاقير للسكان بعد 40 يوماً من البعوضة الحاملة للمرض تبلغ 30 يوماً، ويمكن خالها نقله للبشر. وموهيلي وهي الجزيرة التي وقع عليها الاختيار لتطبيق الاختبار، هي واحدة من جزر القمر التي تقع عند الدخول الشمالي للقناة الموزمبيقية بين شمال مدغشقر وشمال موزمبيق.